

□ Insiemi limitati e illimitati

L'intervallo $(-1, 7)$ è limitato sia inferiormente che superiormente.

Invece l'intervallo $(4, +\infty)$ è limitato inferiormente ma non superiormente.

L'insieme degli x tali che $|x| \geq 5$ è illimitato sia inferiormente che superiormente.

L'insieme dei numeri naturali $N = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ è illimitato superiormente, mentre è limitato inferiormente.

L'ins. degli interi relativi $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ è illimitato sia inferiormente che superiormente.

Dunque:

Definizioni

- Un insieme $E \subseteq R$ si dice “**superiormente limitato**” se ammette un “**limitante superiore**”, ossia se esiste un numero $k \in R$ tale che $\forall x \in E, x \leq k$
- Un insieme $E \subseteq R$ si dice “**inferiormente limitato**” se ammette un “**limitante inferiore**”, ossia se esiste un numero $k \in R$ tale che $\forall x \in E, x \geq k$
- Un insieme $E \subseteq R$ si dice “**limitato**” se è limitato sia inferiormente che superiormente.

- E' ovvio che se un insieme E ammette un limitante superiore k , allora ne ammette infiniti (tutti i numeri $\geq k$); e analogamente, se un insieme E ammette un limitante inferiore k , allora ne ammette infiniti (tutti i numeri $\leq k$)
- Sinonimo di “limitante superiore (inferiore)” è “**maggiorante (minorante)**”
- Un insieme E è superiormente (inferiormente) illimitato quando, comunque grande si fissi il numero positivo M , esiste sempre un elemento di E maggiore di M (minore di $-M$)

□ Il Teorema di Bolzano

Si dimostra che **un insieme $E \subseteq R$ che sia limitato e contenga infiniti punti, deve per forza ammettere almeno un punto di accumulazione (appartenente o no all'insieme).**

Questa proposizione è attribuita a Bernard Bolzano (Praga 1781-1848)

- Se un insieme numerico E è illimitato superiormente (inferiormente), allora si conviene che $+\infty$ ($-\infty$) sia punto di accumulazione per E .
Con questa convenzione, potremmo riformulare il precedente T. di Bolzano scrivendo che “qualunque insieme numerico avente infiniti elementi ammette almeno un punto di accumulazione, che può trovarsi al finito o all'infinito, e appartenere o no all'insieme E ”
- Alcuni testi chiamano “Teorema di Bolzano” un altro enunciato, quello che noi denomineremo “teorema di Darboux” o “dei valori intermedi”.
Questi matematici! Si mettessero un po' più d'accordo!

□ Massimo e minimo di un insieme

Consideriamo un insieme $E \subseteq R$.

- Se esiste un elemento $\bar{x} \in E$, tale che, $\forall x \in E$, risulti $x \leq \bar{x}$, allora si dice che \bar{x} è il **MASSIMO** di E .
- Se esiste un elemento $\underline{x} \in E$, tale che, $\forall x \in E$, risulti $x \geq \underline{x}$, allora si dice che \underline{x} è il **MINIMO** di E .

Un sottoinsieme di R , che sia finito (cioè: costituito da un numero finito di elementi) ammette sempre sia un minimo che un massimo; ma se E è infinito, ciò può anche non avvenire. Esempi:

✓ L'insieme $F = \left\{ \frac{1}{k}, \text{ con } k = 1, 2, 3, 4, \dots \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$

è dotato di MASSIMO (il numero 1), ma, sebbene sia inferiormente limitato, non è dotato di minimo!

✓ L'intervallo semiaperto $[a, b)$ ha come minimo il numero a , ma non ammette massimo.

✓ L'insieme N ha come minimo 0 e (non essendo superiormente limitato) non ammette massimo.

□ Estremo superiore, estremo inferiore di un insieme

In matematica, un concetto PIU' GENERALE del concetto di massimo (o, rispettivamente, di minimo) è il concetto di "estremo superiore" (resp., "estremo inferiore").

Introduciamolo con alcuni esempi, poi ne daremo la definizione.

a) Abbiamo appena osservato che l'insieme $F = \left\{ \frac{1}{k}, \text{ con } k = 1, 2, 3, 4, \dots \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$

è dotato di massimo ($M=1$), ma non di minimo (Infatti, preso un qualsivoglia elemento di F , esistono sempre in F elementi ancora più piccoli di quello considerato).

Tuttavia il numero 0 (che NON appartiene ad F) occupa, nei confronti degli elementi di F , una posizione molto particolare. Tutti gli elementi di F sono maggiori di 0, ma si avvicinano sempre più a 0, al crescere di k , affollandosi in prossimità dello 0 fino a "sfiorarlo", seppure non riescano a raggiungerlo.

Lo 0 è un limitante inferiore dell'insieme F ; ma fra i limitanti inferiori di F , è quello "più prossimo" agli elementi di F , perché ogni intorno destro di 0, anche se viene preso piccolo piccolo piccolo, contiene sempre dei punti di F .

Diremo che il numero 0, sebbene non sia il minimo di F (perché non appartiene a F), è l' "estremo inferiore" dell'insieme F .

b) L'insieme dei numeri naturali $N = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ ha come estremo inferiore 0 (che ne è anche il minimo), mentre il suo estremo superiore è $+\infty$

c) L'intervallo chiuso $[a, b]$ ammette a come minimo, b come massimo

(possiamo dire che a ne è l'estremo inferiore, che, appartenendo all'insieme, ne fa anche da minimo, mentre b ne è l'estremo superiore, che, appartenendo all'insieme, ne fa anche da massimo).

d) L'intervallo aperto (a, b) non ha né massimo né minimo: ammette invece il punto a come estremo inferiore, il punto b come estremo superiore.

e) L'insieme G dei numeri irrazionali appartenenti all'intervallo $[0, 1]$ è privo sia di minimo che di massimo; ammette però 0 come estremo inferiore, 1 come estremo superiore.

f) L'insieme $H = (-\infty, 1) \cup [2, +\infty)$ è illimitato sia inferiormente che superiormente, quindi non ha né minimo né massimo, ma ha come estremo inferiore $-\infty$ e come estremo superiore $+\infty$

Definizione.

Sia $E \subseteq \mathbb{R}$, superiormente limitato. Si dice "**estremo superiore**" di E quel numero L , se esiste, tale che:

I. L sia un limitante superiore per E , ossia $\forall x \in E, x \leq L$

II. Comunque piccolo si fissi un $\varepsilon > 0$, esiste sempre almeno un elemento x di E tale che

$$L - \varepsilon < x \leq L$$

Nel caso poi che E sia superiormente illimitato, si dice che "l'estremo superiore di E è $+\infty$ "

Un teorema estremamente interessante, la cui dimostrazione omettiamo perché dipende da considerazioni piuttosto fini sulla definizione di numero reale, afferma che:

□ (IMPORTANTE): **OGNI insieme numerico $E \subseteq \mathbb{R}$ ammette estremo superiore (finito o infinito).**

Inoltre è immediato dimostrare che:

- **L'estremo sup. di un insieme numerico E , nel caso sia finito, è il minimo fra i limitanti superiori di E** (quindi l'insieme dei limitanti superiori di un insieme E , se non è vuoto, possiede sempre l'elemento minimo)
- **Un insieme numerico E ammette massimo se e solo se l'estremo sup. di E è finito e appartiene ad E . In tal caso, il massimo e l'estremo superiore coincidono.**

Del tutto analoga è la definizione di estremo inferiore di un insieme numerico E .

Sia $E \subseteq \mathbb{R}$, inferiormente limitato. Si dice "**estremo inferiore**" di E quel numero l , se esiste, tale che:

I. l sia un limitante inferiore per E , ossia $\forall x \in E, x \geq l$

II. Comunque piccolo si fissi un $\varepsilon > 0$, esiste sempre almeno un elemento x di E tale che $l \leq x < l + \varepsilon$

Nel caso poi che E sia inferiormente illimitato, si dice che "l'estremo inferiore di E è $-\infty$ "

Teoremi:

□ (IMPORTANTE): **OGNI insieme numerico $E \subseteq \mathbb{R}$ ammette estremo inferiore (finito o infinito).**

- **L'estremo inferiore di un insieme numerico E , nel caso sia finito, è il massimo fra i limitanti inferiori di E** (quindi l'insieme dei limitanti inferiori di un insieme E , se non è vuoto, possiede sempre l'elemento massimo).
- **Un insieme numerico E ammette minimo se e solo se l'estremo inferiore di E è finito e appartiene ad E . In tal caso, il minimo e l'estremo inferiore coincidono.**

L'estremo inferiore di un insieme E viene indicato col simbolo **inf (E)**, l'estremo superiore con **sup (E)**.