



Exercice 1. Dans une assemblée de 250 personnes, on ne remarque que les hommes portant la cravate ou ayant les yeux bleus. Il y a 120 hommes qui portent la cravate, 85 hommes qui ont les yeux bleus, dont 50 portent la cravate. On discute avec une personne choisie au hasard dans cette assemblée.

1. Quelle est la probabilité que ce soit un homme portant la cravate.
2. Quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus et portant la cravate.
3. Quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus ou portant la cravate.
4. Quelle est la probabilité de discuter avec une personne qui n'est ni un homme aux yeux bleus, ni un homme portant la cravate ?

Exercice 2. Lors d'un référendum, deux questions étaient posées 65% des personnes ont répondu "oui" à la première question, 51% ont répondu "oui" à la seconde question, et 46% ont répondu "oui" aux deux questions.

1. Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu "oui" à l'une ou l'autre des questions ?
2. Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu "non" aux deux questions?

Exercice 3. Le sang humain est classé en quatre groupes distincts : A, B, AB et O. Indépendamment du groupe, le sang peut posséder le facteur Rhésus. Si le sang d'un individu possède ce facteur, il est dit de Rhésus positif (noté Rh+); s'il ne possède pas ce facteur, il est dit de Rhésus négatif (noté Rh-).

Sur une population P , les groupes sanguins se répartissent d'après le tableau suivant :

A	B	AB	O
40%	10%	5%	45%

Pour chaque groupe, la proportion d'individus possédant ou non le facteur Rhésus se répartit d'après le tableau suivant :

Groupe	A	B	AB	O
Rh+	82%	81%	83%	80%
Rh-	18%	19%	17%	20%

Un individu ayant un sang du groupe O et de Rhésus négatif est appelé donneur universel.

1. Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population P soit un donneur universel?
2. Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population P ait un sang de Rhésus négatif?
3. Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard parmi ceux de facteur Rhésus négatif soit du groupe O.



Exercice 4. Une étude épidémiologique concernant une certaine maladie a été faite dans des familles ayant 2 enfants de moins de 10 ans : une fille et un garçon. On a constaté que 20% des filles et 50% des garçons sont touchés par la maladie. Par ailleurs, dans les familles, sachant que la fille est touchée par la maladie, le garçon l'est aussi dans 70% des cas.

On choisit par hasard une famille ayant fait l'objet de cette étude. Calculer la probabilité des événements suivants :

1. $A =$: " Les deux enfants sont atteints par la maladie ".
2. $B =$: " Au moins un des deux enfants est atteint ".
3. $C =$: " Aucun des enfants n'est atteint ".
4. $D =$: " Sachant que le garçon est atteint, la fille l'est aussi ".
5. $E =$: " Sachant que le garçon n'est pas atteint, la fille l'est ".

Exercice 5. Un laboratoire pharmaceutique vend un test avec la notice suivante : si un sujet est malade (événement M), alors le test est positif (événement P) avec probabilité α , si un sujet est sain (événement S), alors le test est positif avec probabilité β . Sachant qu'en moyenne il y a un malade sur τ^{-1} personnes.

1. Calculer la probabilité pour que le sujet soit sain alors que son test est positif.
2. Notons par N l'événement "le test est négatif". Calculer la probabilité d'être malade alors que le test est négatif.

Application numérique : $\alpha = 0.98$, $\beta = 0.03$ et $\tau^{-1} = 1000$.

Exercice 6. Une urne contient deux vertes et trois rouges indiscernables au toucher.

1. On extrait simultanément et au hasard deux boules de l'urne. On note X la variable aléatoire égale au nombre de boules vertes figurant dans le tirage.
 - (a) Calculer la loi de probabilité de X . En déduire $\mathbb{E}(X)$.
 - (b) Calculer la probabilité de l'événement $A :=$ " les deux boules tirées sont de même couleur".
2. On effectue deux tirages successifs d'une boule en respectant la règle suivante : si la boule tirée est rouge, on la remet dans l'urne; si elle est verte, on ne la remet pas.
 - a. Calculer la probabilité des événements suivants :
 $B =$: "seule la première boule tirée est verte",
 $C =$: "une seule des deux boules tirées est verte".
 - b. Sachant que l'on a tiré exactement une boule verte, quelle est la probabilité que cette boule verte soit la première tirée?.

Exercice 7. Une urne U contient quatre boules rouges et six boules noires. Une urne V contient une boule rouge et neuf boules noires. Les boules sont indiscernables au toucher.



- A. Un joueur dispose d'un dé à six faces, parfaitement équilibré, numéroté de 1 à 6. Il le lance une fois : s'il obtient 1, il tire au hasard une boule de l'urne U , sinon il tire au hasard une boule de l'urne V .
1. Soit R l'événement "le joueur obtient une boule rouge". Calculer la probabilité $\mathbb{P}(R)$.
 2. Si le joueur obtient une boule rouge, calculer les probabilité qu'elle provienne de U et V respectivement.
- B. Dans ce qui suit on suppose que le joueur répète deux fois l'épreuve décrite ci-dessus, dans des conditions identiques et indépendantes.
1. Soit X la variable aléatoire représentant le nombre des boules rouges obtenues au terme des deux épreuves. Quelle est la loi de probabilité de X ?
 2. Soit x un entier naturel non nul. Lors de chacune des deux épreuves, le joueur gagne x dirhams s'il obtient une boule rouge et perd deux dirhams s'il obtient une boule noire. On désigne par Y la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur en dirhams au terme des deux épreuves.
 - (a) Déterminer la loi de probabilité de Y .
 - (b) Exprimer l'espérance $\mathbb{E}(Y)$ en fonction de x .
 - (c) Pour quelles valeurs de x a-t-on $\mathbb{E}(Y) \geq 0$?

Exercice 8. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des loi de Poisson de paramètres respectifs α et β .

1. Quelle est la loi de la variable aléatoire $S = X + Y$?
2. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(S)$ et la variance $Var(S)$.

Exercice 9. Soit X une variable aléatoire définie sur l'intervalle $[1, 3]$. Sa fonction de densité de probabilité f est continue et de la forme

$$f(x) = \begin{cases} a(x-2)^2 + b & \text{si } x \in [1, 3] \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer a et b .
2. Calculer la fonction de répartition F_X de X . En déduire $P(X > 2)$.
3. Soit Y la variable aléatoire définie par $Y = \sqrt{X}$. Donner la fonction de répartition F_Y de Y .
4. Calculer la fonction densité g de Y .
5. Calculer $E(Y)$.

Exercice 10. Soit X une variable aléatoire continue dont la densité de probabilité est définie par:

$$f(x) = \begin{cases} K \frac{(x + \ln(x))}{x^2} & \text{si } 1 \leq x \leq e \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. Déterminer K .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$ si ces réels existent.