



Unidad Temática 2 Probabilidad

Ejercicios y Aplicaciones



A la hora de resolver los ejercicios y aplicaciones de la Unidad 2 tenga en cuenta las siguientes consignas generales:

- Definir eventos
- Asignar probabilidades a los eventos asociados, haciendo uso de un lenguaje simbólico apropiado
- Justificar y plantear la solución del problema
- Realizar los cálculos necesarios para encontrar el valor numérico solicitado
- Interpretar el resultado para responder la consigna, en el contexto del enunciado

P 2.1.

Encuentre los errores en cada una de las aseveraciones siguientes:

- Las probabilidades de que un vendedor de automóviles venda 0, 1, 2 ó 3 autos en un día dado de febrero son 0,19, 0,38, 0,29 y 0,15, respectivamente.
- La probabilidad de que llueva mañana es 0,40 y la probabilidad de que no llueva es 0,52.
- Las probabilidades de que una impresora cometa 0, 1, 2, 3 ó 4 errores al imprimir un documento son 0,19, 0,34, -0,25, 0,43 y 0,29, respectivamente.

P 2.2.

Verificar si las siguientes afirmaciones son correctas. Justificar respuesta.

- La probabilidad de que una muestra de agua de pozo extraída para la elaboración de hormigones contenga cloruros es de 0,08 y la probabilidad de que no contenga cloruros es 0,82.
- La probabilidad de que una operación de perforación en roca se lleve a cabo con éxito es 0,72 y la de que fracase es de -0,28.
- Si A y B son eventos no mutuamente excluyentes en un espacio muestral S, y se tienen las probabilidades siguientes: $P(A) = 5/10$; $P(B) = 4/10$; $P(A \cap B) = 1/10$, resulta entonces que: $P(A \cup B)^c = 4/10$.
- Las probabilidades de que un vendedor de automóviles cierre 0, 1, 2 o 3 operaciones en cualquier día de agosto son, respectivamente, 0,19; 0,38; 0,29; 0,16.
- La probabilidad de que mañana llueva es de 0,40 y la de que no llueva es de 0,55.
- Las probabilidades de que una impresora cometa 0, 1, 2, 3, 4 o más errores en la impresión de un documento son, respectivamente, 0,19; 0,35; -0,20; 0,45 y 0,30.
- Un experimento arroja tres resultados posibles que se excluyen mutuamente A, B y C. Las probabilidades asignadas son: $P(A) = 1/3$; $P(B) = 1/3$; $P(C) = 1/3$.

P 2.3.

En una población de mil hogares, existen 600 que utilizan sistema de calefacción a gas, 400 usan fuel oil y 200 utilizan ambos sistemas.

- Calcular la probabilidad de que una vivienda de la población estudiada seleccionada aleatoriamente utilice al menos uno de los sistemas de calefacción indicados.
- Calcular la probabilidad de que una vivienda seleccionada al azar utilice calefacción a gas, pero no fuel oil.



P2.4.

De experiencias pasadas un agente de bolsa cree que con las condiciones económicas actuales un cliente invertirá en bonos libres de impuestos con una probabilidad de 0,6, invertirá en fondos mutualistas con una probabilidad de 0,3 e invertirá en ambos con una probabilidad de 0,15. Encuentre la probabilidad de que un cliente invierta:

- a) En por lo menos una de los instrumentos.
- b) En ninguno de los instrumentos.
- c) Sólo en uno de los instrumentos.

P 2.5.

La probabilidad de que un hombre viva diez años más es $\frac{1}{4}$ y la probabilidad de que su esposa viva diez años más es $\frac{1}{3}$. Suponiendo independencia, encontrar la probabilidad de que:

- a) pasados diez años, ambos estén vivos.
- b) pasados diez años, por lo menos uno esté vivo.
- c) pasados diez años, ninguno esté vivo.
- d) pasados diez años, sólo la esposa esté viva.

P 2.6.

La probabilidad de que una industria norteamericana se ubique en Munich es 0,7, la probabilidad de que se ubique en Bruselas es 0,4 y la probabilidad de que se ubique en por lo menos un de estas ciudades es de 0,8. Calcule la probabilidad de que la industria se ubique:

- a) En ambas ciudades.
- b) En ninguna de estas ciudades.
- c) Sólo en Munich.
- d) Sólo en Bruselas.

P 2.7.

De acuerdo con la Consumer Digest (julio/agosto de 1996), la ubicación probable de las PC en una casa son:

- Dormitorio de adultos 0,03
 - Dormitorio de niños 0,15
 - Otro dormitorio 0,14
 - Oficina o estudio 0,40
 - Otros ambientes..... 0,28
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una PC esté en un dormitorio?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que no esté en un dormitorio?
 - c) Suponga que se selecciona una familia al azar entre las familias con una PC, ¿en qué habitación esperaría encontrar una PC?

P 2.8.

En un experimento para estudiar la relación de la hipertensión arterial y los hábitos de fumar, se reúnen los siguientes datos para 180 individuos:

	No fumadores	Fumadores moderados	Fumadores empedernidos
Con hipertensión	21	36	30
Sin hipertensión	48	26	19

Si se selecciona uno de estos individuos al azar, encuentre la probabilidad de que la persona:

- a) Sufra de hipertensión.
- b) Sea fumador moderado.
- c) No fume ni sufra de hipertensión.
- d) Sea fumador empedernido o con hipertensión.
- e) Sufra de hipertensión, dado que la persona es un fumador empedernido.
- f) Sea un no fumador, dado que la persona no sufre de hipertensión.

Analice si:

- g) Ser no fumador y tener hipertensión son eventos independientes.
- h) Ser fumador empedernido y no tener hipertensión son independientes.



P 2.9.

Para matrimonios que viven en cierto suburbio la probabilidad de que el esposo vote en un referéndum es 0,21, la probabilidad de que su esposa vote es 0,28 y la probabilidad de que ambos voten es 0,15. Calcule la probabilidad de que:

- a) Al menos un miembro del matrimonio vote.
- b) Ninguno vote.
- c) Sólo vote el esposo.
- d) Sólo vote la esposa.
- e) Vote la esposa, debido a que vota el esposo.
- f) Vote el esposo, dado que no vota su esposa.
- g) Dado que no vota el esposo, la esposa no vote.
- h) No vote el esposo, dado que vota su esposa.

P 2.10.

Una ciudad tiene dos camiones de bomberos que operan en forma independiente. La probabilidad de que un camión específico esté disponible cuando se lo necesita es 0,96.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno esté disponible cuando se los necesite?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un camión de bomberos esté disponible cuando se lo necesita?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos estén disponibles cuando se los necesite?

P 2.11.

La probabilidad de que un automóvil que ingresa a la estación de servicios a cargar combustible también necesite un cambio de aceite es 0,25, la probabilidad de que necesite un nuevo filtro de aceite es 0,40 y la probabilidad de que necesite cambio de aceite y filtro es 0,14.

- a) Si se tiene que cambiar el aceite, ¿cuál es la probabilidad de que se necesite un nuevo filtro?
- b) Si necesita un filtro de aceite nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga que cambiar el aceite?

P 2.12.

La policía planea reforzar los límites de velocidad mediante el uso de un sistema de radar en cuatro diferentes puntos de la ciudad. Las trampas de radar en cada uno de los sitios L1, L2, L3 y L4, operan el 40%, 30%, 20% y 30% del tiempo, respectivamente; por otra parte, una persona que maneja a gran velocidad cuando va a su trabajo tiene las probabilidades de 0,2, 0,1, 0,5 y 0,2, respectivamente, de pasar por esos lugares.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que reciba una multa por conducir con exceso de velocidad?
- b) Si la persona es multada por conducir con exceso de velocidad en su camino al trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que pase por el sistema de radar que se ubica en L2?
- c) Si la persona siempre excede la velocidad permitida, ¿por cuál camino le conviene ir?

P 2.13.

Una cadena de tiendas de pintura sólo produce y vende pintura de látex y semiesmaltada. Con base en las ventas históricas, la probabilidad de que un cliente compre látex es 0,75. De los que compran pintura látex, 60% también compran rodillos. Pero 30% de los compradores de pintura semiesmaltada compra rodillos. Un comprador que se selecciona al azar compra un rodillo y una lata de pintura, ¿cuál es la probabilidad de que sea pintura de látex?

P 2.14.

Las muestras de vidrio de un laboratorio se colocan en empaques pequeños o en empaques grandes. Suponga que el 2% y el 1% de las muestras enviadas en empaques pequeños y grandes, respectivamente, se rompen durante el trayecto a su destino. Si el 60% de las muestras se envían en empaques grandes, y el 40% en empaques pequeños, ¿cuál es la proporción de muestras que se romperán durante el envío?

P 2.15.

El programa para detectar fraudes en las tarjetas telefónicas utilizadas por los consumidores, registra todos los días el número de áreas metropolitanas donde se originan todas las llamadas. Se tiene que el 1% de los usuarios legítimos hacen al día llamadas que se originan en dos o más áreas metropolitanas. Sin embargo, el 30% de los usuarios fraudulentos hacen al día llamadas desde dos o más áreas metropolitanas. La proporción de usuarios fraudulentos es 0,01%. Si el mismo usuario hace en un día dos o más llamadas desde dos o más áreas metropolitanas, ¿cuál es la probabilidad de que sea un usuario fraudulento?



P 2.16.

Se está experimentando un sistema de alerta temprana que avisa peligro solamente cuando dos de sus tres componentes fallan. Los resultados obtenidos permiten establecer que las probabilidades de que fallen los componentes A, B y C son 0,10; 0,15 y 0,20 respectivamente. También se sabe que la falla de C es independiente de las otras dos, mientras que la probabilidad de que falle B sabiendo que ha fallado A es 0,50. En estas condiciones, calcular la probabilidad de que el sistema avise peligro y sacar conclusiones.

P 2.17.

Una pieza cerámica utilizada para revestimiento puede ser clasificada como de segunda clase debido a que, entre otras cosas, presente picaduras o a que las dimensiones estén fuera de tolerancia. En una prueba de control de calidad se encuentra que el 10% de las piezas tienen ambos defectos. También se detecta que el 25% están picadas y el 40% tienen dimensiones fuera de tolerancia. Determinar la probabilidad de que una pieza elegida al azar no tenga picaduras ni tenga dimensiones fuera de tolerancia.

P 2.18.

Un sistema de pesaje para el control de tránsito de una ruta nacional utiliza un sistema que tiene dos mecanismos de pesada: uno electrónico y otro mecánico. Se estima que la probabilidad de que por lo menos uno de ellos funcione correctamente es de 0,99. La probabilidad de que funcione el electrónico es de 0,96. Si el electrónico falla, calcular la probabilidad de que el sistema falle.

P 2.19.

Los resultados del relevamiento realizado en una población industrial revelan que hay 1550 usuarios del sistema hídrico. Sin embargo las concesiones de uso otorgadas indican que 816 usuarios han solicitado derecho de uso del recurso hídrico superficial, 205 del subterráneo, mientras que 214 pagan por el uso conjunto de ambos.

- Calcular la probabilidad de que un usuario seleccionado al azar utilice al menos uno de los sistemas de abastecimiento indicados.
- Calcular la probabilidad de que un usuario seleccionado al azar utilice el recurso hídrico subterráneo, pero no el superficial.
- Calcular la probabilidad de que un usuario seleccionado aleatoriamente esté en infracción por utilizar el recurso hídrico sin concesión.

P 2.20.

De 40 licitaciones a las que se presentó una empresa, en 16 de ellas obtuvo sólo la pavimentación de un barrio, en 8 sólo la electrificación del mismo y en 10 ambas obras. De mantenerse las condiciones anteriores, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa obtenga al menos una de las obras indicadas en la próxima licitación que se presente?

P 2.21.

Según los datos de la estación sismológica de una ciudad determinada, la ocurrencia de un *temblor moderado* en un minuto cualquiera tiene una probabilidad de 10^{-5} . Calcular la probabilidad de que en dicha ciudad no se produzcan *temblores moderados* en un año cualquiera.

P 2.22.

Se toman muestras de la espuma proporcionada por dos proveedores y se clasifican de acuerdo con la forma en que se adecuan a las especificaciones. A continuación se resumen los resultados obtenidos al analizar cuarenta muestras:

		Cumple con las especificaciones	
		SÍ	NO
Proveedor	1	18	2
	2	17	3

- Si la muestra seleccionada no cumple con las especificaciones, ¿cuál es la probabilidad de que sea del proveedor 2?
- Si la muestra seleccionada es del proveedor 2, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla las especificaciones?
- Los eventos “la muestra es del proveedor 1” y “la muestra cumple con las especificaciones”, ¿son independientes?



P 2.23.

Una compañía telefónica regional opera tres estaciones relevadoras idénticas en diferentes sitios. Durante un período de un año, el número de desperfectos reportados por cada estación y las causas se muestran a continuación:

Causas	Estaciones	A	B	C
E: Problemas con el suministro de electricidad		2	1	1
F: Desperfectos de la computadora		4	3	2
G: Fallas del equipo eléctrico		5	4	2
H: Fallas ocasionadas por otros errores humanos		7	7	5

- Si se reporta una falla, ¿cuál es la probabilidad de que sea un desperfecto de la computadora?
- Si se confirma que el desperfecto es de la computadora, ¿cuál es la probabilidad de que se haya producido en la estación A?
- Suponga que se detecta una falla que se encuentra que fue ocasionada por otros errores humanos, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la estación C?
- Se reporta una falla del equipo eléctrico, ¿cuál es la probabilidad de que sea en la estación B?

P 2.24.

La siguiente tabla presenta un resumen del análisis realizado a las flechas de un compresor para determinar el grado con que éstas satisfacen ciertos requerimientos:

		La curvatura cumple con los requerimientos:	
		SÍ	NO
El acabado superficial cumple con los requerimientos:	SÍ	345	5
	NO	12	8

- Si se toma una flecha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con los requerimientos de acabado superficial?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la flecha seleccionada cumpla con los requisitos de acabado o con los de curvatura?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la flecha cumpla con los requisitos de acabado o que no cumpla con los de curvatura?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la flecha cumpla con los requisitos de acabado y curvatura?

Si las flechas se clasifican, además, en términos de la máquina herramienta utilizada en su fabricación, de la siguiente manera:

			La curvatura cumple con los requerimientos:	
			SÍ	NO
Máquina herramienta: 1	El acabado superficial ↓ Cumple con requerimientos:	SÍ	200	1
		NO	4	2
2	Cumple con los requerimientos:	SÍ	145	4
		NO	8	6

- Si se elige una flecha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con los requerimientos de acabado superficial o con los de curvatura, o provenga de la máquina herramienta 1?
- Si se elige una flecha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con los requerimientos de acabado superficial o con los de curvatura, o provenga de la máquina herramienta 2?
- Si se elige una flecha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con los requerimientos de acabado superficial y curvatura, o provenga de la máquina herramienta 2?
- Si se elige una flecha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cumpla con los requerimientos de acabado superficial o que provenga de la máquina herramienta 1?

P 2.25.



Se toman muestras de dos proveedores de aditivos para hormigones y se hace una evaluación a éstas para determinar si cumplen con ciertas especificaciones. A continuación se resumen los resultados obtenidos con 126 muestras.


Proveedor	Cumple con las especificaciones	
	SI	NO
1	80	4
2	40	2

Sea A el evento "la muestra es del proveedor 1" y B el evento "la muestra cumple con las especificaciones".

- ¿Son los eventos A y B independientes?
- ¿Son los eventos A' y B independientes?

P 2.26.

Una ciudad está vinculada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) mediante dos vínculos a través de los cuales se abastece de energía eléctrica. La confiabilidad del primer vínculo (probabilidad de que funcione sin fallas) es 0,96, mientras que para el segundo es 0,94. Se sabe también que el 91% del tiempo ambos vínculos funcionan simultáneamente sin falla alguna. Determinar la probabilidad de que la ciudad no se quede sin suministro de energía eléctrica.



P 2.27.

Una empresa compra acero a tres proveedores: 20% al proveedor A, 20% al proveedor B y 60% al proveedor C. Por experiencia previa sabe que el 10% de las barras del proveedor A no cumple las especificaciones, mientras que para los proveedores B y C dichos porcentajes son 12% y 4%, respectivamente.

- Calcular la probabilidad de seleccionar en obra una barra para ser ensayada que no cumpla las especificaciones estipuladas.
- Se selecciona una barra y resulta que no cumple las especificaciones, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido entregada por el proveedor B?

P 2.28.

El gobierno provincial debe realizar inversiones en el sector eléctrico con el fin de asegurar el abastecimiento de la demanda eléctrica en los próximos diez años. Para ello debe decidir dónde construir dos nuevas centrales térmicas, habiéndose sugerido los departamentos de Maipú y Luján. Teniendo en cuenta que el número de plantas que se construirán será función de los fondos disponibles y de las recomendaciones de los estudios realizados, utilizando pares ordenados donde la primera coordenada indique el número de plantas de generación a construir en Maipú y la segunda coordenada el número de centrales a construir en Luján:

- Definir el espacio muestral S . Graficar el espacio muestral para el número de nuevas centrales térmicas que se construirán en Maipú y Luján.
Dados los eventos:
 A : Ambos departamentos, Maipú y Luján, obtienen una de las dos plantas de energía térmica.
 B : Maipú no obtiene ninguna de las dos plantas de energía térmica.
 C : Maipú y Luján obtienen igual número de nuevas centrales térmicas.
- Indicar cómo son los eventos A y C .
- Hacer una lista de los resultados contenidos en cada uno de los siguientes eventos y exprese también los eventos en palabras: $A \cup C$; $A \cap B$; B' .

P 2.29.

En un edificio de departamentos se utilizan dos tipos de detectores de incendios. Si hay humo la probabilidad de que sea detectado por el primer tipo es 0,95; que lo sea por el segundo es 0,98 y que sea detectado por ambos tipos es 0,96. Si hay humo, calcular la probabilidad de que:


- sea detectado por alguno de ellos.
- lo detecten ambos.
- Sólo uno de los sistemas instalados lo detecte.



P 2.30.

Un laboratorio de ensayo se ocupa de tres tipos de defectos del ensayo de hormigones. Sea A el evento que define la falta de paralelismo entre las caras; B el evento que representa una compactación defectuosa y C el evento que consiste en que una lectura errónea del instrumental al realizar el ensayo.

Expresar en palabras qué eventos quedan representados en las siguientes regiones del *diagrama de Venn*:



- a) La región 2.
- b) Las regiones 1 y 3 juntas.
- c) Las regiones 3, 5, 6 y 8 juntas.

P 2.31.


Según el Censo '91, para las viviendas particulares ocupadas muestreadas del Gran Mendoza clasificadas por tipo, se obtuvo la información de la tabla de contingencia siguiente:

Tipo de vivienda → Departamento ↓	TOTALES	CASA	RANCHO	DEPARTAMENT O	OTRO
Capital	3.199	1.959	119	1.082	39
Godoy Cruz	4.211	3.665	152	375	19
Guaymallén	5.200	4.431	187	542	40
Las Heras	3.480	2.974	193	281	32
Total Gran Mendoza	16.090	13.029	651	2.280	130

Si se disponen las fichas censales de la información de la tabla en una urna, calcule la probabilidad de que al seleccionar aleatoriamente entre las viviendas del Gran Mendoza, la seleccionada resulte ser: a) una casa; b) un departamento; c) un rancho; d) otro tipo de vivienda.

P 2.32.

El circuito hidráulico siguiente trabaja por gravedad, escurriendo de izquierda a derecha. Suponga que las válvulas son accionadas a distancia y que estos dispositivos trabajan de manera independiente con la probabilidad indicada en cada uno de ellos. Si todas las válvulas están cerradas y se instruye con la señal de apertura, ¿cuál es la probabilidad de que el agua pase de la posición 1 a la posición 2?



P 2.33.

Una empresa industrial grande usa tres hoteles locales para proporcionar hospedaje nocturno a sus clientes. Por experiencia pasada se sabe que a 20% de los clientes se les asignan habitaciones en el NH Regency, al 50% en el Aconcagua y al 30% en el Plaza. Si hay fallas en la plomería en el 5% de las habitaciones del NH Regency, en 4% de las habitaciones del Aconcagua y en 8% de las habitaciones del Plaza. Calcule la probabilidad de que:

- a) A un cliente se le asigne una habitación con fallas en la plomería.
- b) A una persona con una habitación que tiene problemas de plomería, se le haya asignado hospedaje en el Plaza.



P 2.34.

La probabilidad de que un doctor diagnostique de manera correcta una enfermedad particular es 0,7. Dado que el doctor hace un diagnóstico incorrecto, la probabilidad de que el paciente presente una demanda es 0,9. ¿Cuál es la probabilidad de que el doctor haga un diagnóstico incorrecto y el paciente lo demande?

P 2.35.

El *Grupo Concreto* emplea a tres consultoras, A, B, C, con probabilidades de 0,11; 0,35 y 0,25, respectivamente. De la experiencia pasada sabe que, cuando establece contratos con la consultora A, la probabilidad de que los costos de su propia oferta sean excesivos es 0,05; cuando contrata a la B, 0,03; y cuando el contrato lo establece con la C, 0,15. Suponga que el *Grupo Concreto* ha realizado una oferta y su propuesta ha sido descartada por su costo excesivo:

- a) ¿cuál es la probabilidad de que la empresa consultora implicada sea la compañía C?
- b) ¿cuál es la probabilidad de que la empresa consultora implicada sea la compañía A?

P 2.36.

La tabla siguiente resume los resultados del análisis de muestras de acero galvanizado en cuanto a peso del recubrimiento y rugosidad de la superficie.

		Peso del recubrimiento	
		Alto	Bajo
Rugosidad de la superficie	Alta	12	16
	Baja	88	34

- a) Si se toma una muestra y resulta que el peso del recubrimiento es alto, ¿cuál es la probabilidad de que la rugosidad de la superficie sea alta?
- b) Si se toma una muestra y resulta que la rugosidad de la superficie es alta, ¿cuál es la probabilidad de que el peso del recubrimiento sea alto?
- c) Si se toma una muestra y resulta que la rugosidad de la superficie es baja, ¿cuál es la probabilidad de que el peso del recubrimiento sea bajo?

P 2.37.

Se toman muestras de cierto producto proporcionado por dos proveedores y se clasifican de acuerdo con la forma en que se adecuan a las especificaciones. El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos al ensayar cuarenta muestras:

		Cumple las especificaciones	
		SI	NO
Proveedor	1	18	2
	2	17	3

Sea A el evento "la muestra es del proveedor 1" y B el evento "la muestra cumple con las especificaciones".

Dibujar diagramas de Venn, interpretar conjuntistamente y determinar el número de muestras que:

- a) cumplen con las especificaciones y no son del proveedor 1.
- b) no cumplen con las especificaciones.
- c) son del proveedor 1 o cumplen con las especificaciones.

Calcular las siguientes probabilidades:

- d) Si la muestra seleccionada no cumple con las especificaciones, calcular la probabilidad de que sea del proveedor 2.
- e) Si la muestra seleccionada es del proveedor 2, calcular la probabilidad de que cumpla las especificaciones.

Responder y justificar:

- f) ¿Son los eventos A y B independientes?
- g) ¿Son los eventos A' y B independientes?



2.38. EX241201

Según los registros históricos, la probabilidad de que llueva durante cualquier período de tiempo de 24 horas del mes de enero en la estación A vale $4/10$. La probabilidad de que ocurra lo mismo en la estación C es también igual a $4/10$. La probabilidad de que llueva simultáneamente en ambas estaciones es igual a $4/15$. Calcule la probabilidad de que durante un período de tiempo de 24 horas en el próximo mes de enero:

- llueva en la estación A, dado que llueva en la estación C.
- llueva en la estación C, dado que llueva en la estación A.
- llueva por lo menos en una de las dos estaciones.
- Indicar en el informe si los eventos “llueva en la estación A” y “llueva en la estación C” son estadísticamente independientes. Justificar la respuesta.
- De acuerdo al resultado del apartado anterior, ¿es correcto concluir que si llueva en la estación A se registrarán lluvias en la estación C, en el mismo período de 24 horas? Justificar respuesta.

2.39. EX140202

De acuerdo a los resultados obtenidos, sobre un total de 289 alumnos calificados al finalizar el Ciclo Lectivo 2001, promocionaron 107, regularizaron 166 y deben recurrir la asignatura 16. De estudios previos realizados mediante encuestas a los alumnos, se sabe que:

- Si un alumno ha promocionado la asignatura, la probabilidad de que haya dedicado un mínimo de cuatro horas semanales para estudio de la asignatura es 0,505.
- Si un alumno ha regularizado la asignatura, la probabilidad de que haya dedicado un mínimo de cuatro horas semanales para estudio de la asignatura es 0,090.
- Si un alumno debe recurrir la asignatura, la probabilidad de que haya dedicado un mínimo de cuatro horas semanales para estudio de la asignatura es 0,062.

De mantenerse este comportamiento:

- ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno calificado al finalizar el Ciclo Lectivo 2001 seleccionado al azar, haya dedicado un mínimo de cuatro horas semanales para estudio de la asignatura?
- Si un alumno seleccionado al azar ha dedicado un mínimo de cuatro horas semanales para estudio de la asignatura, ¿cuál es la probabilidad de que haya promocionado la asignatura?

2.40. EX230502

Una investigación de las quejas de los consumidores referentes a productos ha generado gran interés por parte de los fabricantes en la calidad de sus productos. Un fabricante de componentes industriales realizó un análisis de un gran número de quejas de los consumidores y determinó que entraban en las seis categorías que se muestran en el cuadro siguiente.

	Razón de la queja			Totales
	Eléctrica	Mecánica	Aspecto	
Durante el periodo de garantía	18%	13%	32%	63%
Después del periodo de garantía	12%	22%	3%	37%
Totales	30%	35%	35%	100%

Si se recibe una queja de un consumidor durante el período de garantía, ¿qué probabilidad hay de que la causa de la queja sea el *aspecto* del producto (ralladuras, abolladuras u otras imperfecciones de terminación del producto)?

2.41. EX040702

En una operación de fabricación se utilizan dos líneas de producción para ensamblar fusibles electrónicos. Ambas líneas producen la misma proporción de fusibles y generalmente el 2,5% de los fusibles que produce cada una de ellas tiene defectos. Sin embargo, la línea de producción identificada con el número uno, recientemente experimentó problemas mecánicos y produjo 6% de fusibles defectuosos durante un período de tres semanas. Esta situación no se conoció antes de que varios lotes de fusibles electrónicos producidos en este período se enviaran a los clientes. Si uno de los fusibles probados por un cliente resultó tener defectos, ¿qué probabilidad hay de que el lote del que provino se haya producido en la línea que tuvo problemas?. Suponga que todos los fusibles del lote que se probó se produjeron en el período de las tres semanas indicado.



2.42. EX281102

Una cervecería utiliza dos máquinas embotelladoras, pero no operan simultáneamente. La segunda máquina actúa como sistema de respaldo de la primera y sólo opera cuando la primera se descompone durante las horas de trabajo. La probabilidad de que la primera máquina se descomponga en horas de trabajo es de 0,20. Si la primera máquina se descompone, se enciende segunda máquina y tiene una probabilidad de descomponerse de 0,30.

- Calcule la probabilidad de que el sistema embotellador no esté funcionando en horas de trabajo.
- Si la *confiabilidad* del proceso de embotellado se define como la probabilidad de que el sistema esté operando en horas de trabajo, calcule la *confiabilidad* del proceso de embotellado de la cervecería.
- Determine la probabilidad de que las dos máquinas embotelladoras estén funcionando en horas de trabajo.

2.43. EX130203

Un estudio ha revelado que el 80 por ciento de los alumnos hacen las Autoevaluaciones mientras estudian la materia. Se sabe también que el 90 por ciento de los que hacen las autoevaluaciones aprueban el examen; de los estudiantes que no resuelven las autoevaluaciones, el 60 por ciento aprueba el examen. Javier es evaluado y aprueba el examen. ¿Cuál es la probabilidad de que Javier haya resuelto las autoevaluaciones mientras estudiaba la materia?

2.44. EX100703

El intendente municipal no tiene fondos suficientes para realizar una obra de infraestructura que es prioritaria para los habitantes del departamento. Ha revisado la gestión de gobierno anterior y encontró que en una situación parecida, el intendente anterior informó que el 87% de los vecinos apoyó la modalidad de obras reembolsables. Decide entonces realizar una encuesta y preguntar a sus vecinos si están dispuestos a colaborar con el municipio haciendo que la obra sea reembolsable.

- Aceptando que la estimación de la gestión anterior es correcta, calcule la probabilidad de que al seleccionar una muestra aleatoria de vecinos, no se encuentren vecinos que apoyen la modalidad de obras reembolsables entre los dos primeros entrevistados y recién el tercero entrevistado apoye la modalidad.
- El intendente sabe que el 72% de los vecinos de su municipio paga sus impuestos al día. Después de tomar una muestra de 174 vecinos, revisó los padrones correspondientes a cada uno de ellos y encontró que, de los que tenían sus impuestos al día, el 94% apoyó la modalidad de obras reembolsables, mientras que de los que tenían deudas con la municipalidad, sólo apoyó la modalidad de obras reembolsables el 69%. Si se elige aleatoriamente un vecino para un reportaje y resulta que apoya la modalidad de obras reembolsables, ¿qué tan probable es que tenga sus impuestos con la municipalidad al día?

2.45. EX310703

En un programa de capacitación industrial, un grupo de aprendices es instruido con el método A y otro grupo con el método B. En el método A, durante cinco días los aprendices dejan de trabajar en la planta industrial y asisten a un curso de capacitación que dura cuarenta horas. En el método B, los aprendices son capacitados en la misma planta industrial bajo la supervisión de expertos de la planta durante el mismo tiempo. Al finalizar la capacitación son evaluados y calificados.

- De experiencias previas se sabe el 70% de los aprendices son capacitados con el método A, el 30% con el método B, y que el 89,9% de los aprendices que participan del programa de capacitación aprueban la evaluación. Se sabe también que el 95% de los aprendices capacitados con el método A aprobaron la evaluación, mientras que, de los que se capacitaron con el método B, aprobó el 78%. Suponga que se produjo un problema en la planta debido a un error humano y el responsable es un aprendiz que aprobó el programa de capacitación. La probabilidad de que haya sido entrenado con el método B es:

(a) 0,73971 (b) 0,30 (c) 0,26029 (d) Menor de 0,15

- Ya se ha dicho que el 89,9% de los aprendices aprueba el programa de capacitación. Si se toma una muestra aleatoria de tres calificaciones de aprendices que han participado del programa, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno haya aprobado el programa?

(a) 0,72657 (b) 0,00103 (c) 0,30300 (d) Ninguna de las anteriores



- c) Si el 95% de los aprendices capacitados con el método A aprueban la evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que si se evalúan 10 nuevos aprendices capacitados con el método A, recién el tercero de ellos sea el primero en aprobar la evaluación?
- (a) 0,009500 (b) 0,045125 (c) 0,002375 (d) Ninguna de las anteriores
- d) Sea A el evento *el aprendiz es capacitado con el método A*; sea A' el evento *el aprendiz es capacitado con el método B*, y sea C el evento *el aprendiz aprueba el programa de capacitación*. Teniendo en cuenta la información del apartado a) de éste problema, se cumple que:
- (a) A y C son eventos independientes (b) A y A' son eventos mutuamente excluyentes
(c) A y C son eventos complementarios (d) Todas las anteriores

2.46. EX270406

Vanina Alesci, editora de una importante compañía de libros de texto esta analizando si conviene publicar un nuevo libro sobre estadísticas de negocios que le han propuesto. De los libros publicados con anterioridad, Vanina sabe que el 70% de los libros revisados obtuvieron una calificación favorable y el 30% una calificación no favorable. Sabe también que, de los libros que obtuvieron una calificación favorable en el proceso de revisión, el 80% fueron exitosos; si la calificación fue no favorable, sólo el 30% resultaron exitosos. De mantenerse este comportamiento:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el nuevo libro sobre estadísticas de negocio reciba una calificación favorable y sea un éxito?
- b) Suponga que el nuevo libro ya se publicó y se sabe que fue todo un éxito, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido calificado favorablemente en el proceso de revisión?

2.47. EX090206 – Horas semanales extra clase

- a b c d e (1) En base a los resultados obtenidos en la muestra se sabe que, si el estudiante dedica semanalmente por lo menos el tiempo promedio que requiere la asignatura, la probabilidad de promocionarla es 0,800; mientras que si le dedica menos, la probabilidad de promocionarla se reduce a 0,625. También se sabe que el 38,5% de los estudiantes le dedican a la asignatura por lo menos el tiempo promedio.
- a) Si se selecciona al azar un alumno cualquiera de la muestra, la probabilidad de que haya promocionado la asignatura no supera el valor 0,7.
- b) Si Mauro ha sido seleccionado al azar entre los alumnos de la muestra y se sabe que ha promocionado la asignatura, la probabilidad de que haya dedicado más que el tiempo promedio es un valor comprendido entre 0,44 y 0,45, inclusive.
- c) Si se selecciona al azar un alumno de la muestra, la probabilidad de que haya dedicado más del tiempo promedio y que haya promocionado la asignatura, está entre 0,30 y 0,35.
- d) Todas las anteriores.
- e) No sé.