

GESUNDHEIT / SALUD

!!! ACHTUNG / ATENCIÓN !!!
ELIQUIS

Por favor, complete esta sección o pídale a su médico que la complete

Nombre: **Bernd Meibohm**

Fecha de nacimiento: **28.05.1946**

Indicación: **infarto**

Dosis: **2 x 5mg diariamente** mg dos veces al día

Nombre del médico: **Pino Ageno** (centro de salud Schamann, Las Palmas)

Número de teléfono del médico: **+34687521052**

 Bristol Myers Squibb

 Pfizer

1346224A4

Tarjeta de información para el paciente



Eliquis[®]
(apixabán)

**Lleve siempre consigo
esta tarjeta**

Muestre esta tarjeta a su farmacéutico, dentista, y cualquier otro profesional sanitario que le trate.

Información para pacientes

- Tome Eliquis de forma regular siguiendo las instrucciones. Si olvidó una dosis, tómela en cuanto se acuerde y después siga tomando el medicamento como de costumbre.
- No interrumpa el tratamiento con Eliquis sin hablar primero con su médico, porque estaría en riesgo de sufrir un ictus u otras complicaciones.
- Eliquis ayuda a hacer su sangre más fluida. Sin embargo, esto puede aumentar el riesgo de sangrado.

- Los síntomas y señales de sangrado incluyen hematomas o sangrado bajo la piel, heces de color negrozco, sangre en la orina, sangrado por la nariz, aturdimiento, cansancio, palidez o debilidad, dolor de cabeza repentino, tos con sangre o vómitos de sangre.
- En caso de presentar un sangrado que no cese por si mismo, **busque atención médica de forma inmediata.**
- Si necesita someterse a una cirugía u otro procedimiento invasivo, informe a su médico que está tomando Eliquis.

Abril 2021

Estoy recibiendo tratamiento anticoagulante con Eliquis (apixabán) para prevenir los coágulos sanguíneos

Información para profesionales sanitarios

- Eliquis (apixabán) es un anticoagulante oral que actúa por inhibición directa y selectiva del factor Xa.
- Eliquis puede aumentar el riesgo de sangrado. En caso de eventos de sangrado mayor, debe interrumpirse el tratamiento inmediatamente.
- El tratamiento con Eliquis no requiere monitorización rutinaria de exposición a apixabán. Un ensayo cuantitativo anti-factor Xa calibrado puede ser útil en situaciones excepcionales, por ejemplo sobredosis o cirugía de emergencia (no se recomiendan los ensayos de tiempo de protrombina (TP), Ratio Internacional Normalizado (INR) y el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa)) – ver Ficha Técnica.
- Está disponible un agente para revertir la actividad anti-factor Xa.

[ELIQUIS INFORMACIONES INTERNET \(ES\)](#)

[ELIQUIS INFORMACIONES INTERNET \(D\)](#)



Fecha de Impresión: 15-nov-2021

LISTADO DE NOTAS

Paciente	BERND MEIBOHM	Sexo	Hombre	Cama	
NHC	946805	EDAD	75 Años		
Alergias					
Id. Proceso	45161051				
Proceso	Consultas Externas Rehabilitación	Ámbito	HOSPITALIZACION		
Fecha Inicio Proceso	03-mar-2020	Fecha Fin Proceso			

06-sep-2021 12:19	Evolución CAR CEX
Acude sin cita , IAM febrero de 2020, ICP y revascularizacion de dos vasos en dos tiempos. Buena funcion VI. Solicita valoracion de estrategia antitrombótica de cara a cirugia odontológica Paciente con FA en tto con eliquis (CHA2DS2Vasc 4 puntos, riesgo moderado)	
Plan -Puede suspender eliquis 48h antes de intervención (asumiendo riesgo moderado de ACV isquemico) y reiniciar tan pronto como sea posible	
Creador:	SANCHEZ PEREZ, ANDRÉS ALBERTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA
DR. NEGRÍN
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

