

ศัลยกรรมเพื่อความงาม - รักษาปลาใส่ไหล

By : Pat . z z +

โป๊ง 49

สวัสดีท่านผู้อ่าน ชาวไทยครอบครัวดี คราวนี้ไม่พาล่ามนานขอ นำเสนอเลยละกัน งวดนี้ผมได้รับการอนุเคราะห์ภาพและวิธีการรักษาโรคใส่ไหล จากน้อง แพท (Pat . z z) ซึ่งประสบปัญหาจากปลาป่วย และได้ค้นหาสืบเสาะวิธีดังกล่าวมารักษาปลา นับว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ถ่อมมือถ่อมเท้า อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนๆ พี่น้าเขาเป็นตัวอย่าง (แต่นับว่าน้องเขาใจถึงมากๆ) โดยผมเห็นว่าอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ สามารถนำมาแนวทางตัวอย่างในการรักษาโรคใส่ไหลได้ และได้ผลจริงเลยขอนำมาเสนอกันครับ โดยบทความนี้ขอเน้นรูปและวิธีการตัด เอาแบบจะจะ ขออภัยถ้าหวาดเสียวเกินไป โดยน้องแพท ได้ให้ปากคำกับผมไว้ดังนี้ครับ

“เรื่องของเรื่อง ก็คือ ปลาหมอสีตัวเมีย ใส่ไหล มาเกือบ 2 เดือนแล้ว แล้วได้เจอกระทู้ของพี่ คนนึง (โทษครับ จำชื่อไม่ได้) ที่ทำการผ่าตัดใส่ปลาเอง ผมจึงมีความคิดว่า..... เจียน มัน ซะ”

โดยประวัติผู้ป่วยมีดังนี้ครับ เป็นปลาเพศเมีย ไซ้แล้ว มีอาการป่วย ใส่ไหล ไม่ค่อยกินอาหาร มาเป็นเวลา เกือบ 2 เดือน อายุปลาไม่ทราบ เพราะถามแล้วไม่ตอบ ??

สาเหตุ ในการทำก็ไม่มาก ก็แค่รำคาญลูกตาที่จะเห็นปลาที่ตนรักมีใส่ไหล ก็แค่นั้น น้องแพท จึงได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ครับ

1. กรรไกรผ่าตัด เน้นขอให้คมๆ มิฉะนั้นจะทำให้เนื้อเยื่อช้ำมาก
2. ปากคีบ หรือแหนบ นั้นเอง
3. แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70 %
4. ภาชนะสำหรับใส่ปลา ในที่นี้ได้ใช้กาละมัง
5. เกลือแกง
6. ถุงมือพลาสติก

โดยน้องแพทได้บรรยายสภาพศพ เข้ย อาการป่วยของปลาไว้ได้อย่างสยดสยอง ดังนี้

ดูที่ใส่ ที่ไหล ออกมาสิครับ ยาวจริง ๆ ที่จริง ยาวกว่านี้ครับ เกือบ 2 ซม. แน่ะ แกรมใส่ที่เสีย สีออก คล้ำ ๆด้วย ครับ (ยังจะมาย้ำให้หวาดเสียวกันเข้าไปอีก

แพท ยังกล่าวอีกว่า โดยวิธีการก็ไม่ยากอะไร โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับผม

(ก่อนทำกรรณอ่านคู่มือในเข้าใจ และไม่สามารถประยุกต์ไปใช้ในการตัดสายสะดือเด็กแรกคลอด ต้องบอกเผื่อๆไว้ เพราะเกรงว่าจะเกิดหมอต้มยำหน้าใหม่ระดับวงการอีกหลายท่านนั่นเอง)

1. ทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยการแช่ลงในแอลกอฮอล์ รวมถึงล้างมือของเราให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
2. ใส่ถุงมือ จะยางหรือพลาสติก อันนี้ก็แล้วแต่จะหาได้ครับ
- 3.--- ขอเพิ่มเติมการจับปลาสักนิด ควรใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆ ห่อตัวปลาก่อนการตัดเพื่อให้ไม่ลื่นหลุดมือและป้องกันปลาดิ้น แต่วิทยากรเราชำนาญแล้วจึงเว้นไปครับ
4. จับปลาหงายท้องให้หัวปลาอยู่ในอุ้งมือเพื่อที่จะบังคับไม่ให้ปลาดิ้นได้
5. ใช้ปากคีบดึงลำไส้ปลาออกมาเล็กน้อย ให้เห็นสีที่แดงไม่คล้ำ (ควรมีลูกมือหรือผู้ช่วยในการดึงไส้ออกมา เวลาตัดจะสะดวกมากยิ่งขึ้น)
6. ใช้กรรไกรตัดให้พอดีกับลำไส้ โดยตัดบริเวณที่เป็นเนื้อไส้สีแดง หากตัดบริเวณสีคล้ำปลาก็จะไม่หายขาดครับ
7. หลังตัดเสร็จนำปลาแช่ลงในน้ำผสมเกลือสักพักเพื่อกระตุ้นการสร้างเมือกชนิดเดียวกับที่สูญเสียไป
8. แนะนำให้ผสมยาแก้อักเสบลงในอาหารบ้างเพื่อช่วยให้ปลาหายเร็วขึ้น
9. นำใส่ตู้พยาบาล รอดูอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดครับ

โดย หมอแพท ได้ดูอาการมาจนครบ 2 สัปดาห์ ปลาไม่มีไส้ไหลเพิ่ม กินอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ จึงระบุได้ว่าปลาไม่มีอาการแทรกซ้อน เป็นปกติดี และมาตอนนี้อยู่ประมาณ 2-3 เดือน ก็ได้ใช้เพาะพันธ์แล้วครับ

หวังว่าบทความนี้คงพอที่จะช่วยในการรักษาอาการไส้ไหลในปลาได้ไม่บ้างก็น้อยนะครับ หากจะสอบถาม หรือติชมประการใดนั้น ด้านวิธีการรักษา ขอให้ไปสอบถามน้องแพทได้ในเว็บ SCC. น้องเขาเข้าเกือบทุกวัน ส่วนจะติชม หรือแนะนำในการเขียนรบกวน โทรมาติชม หรือเมลล์มาหาผมได้ครับ

ปล. ท่อไข่ กับลำไส้ ดูอย่างไร -ท่อไข่นั้นสีจะออกขาว เป็นเส้นตรงชี้ไปที่ด้านหลัง โคนจะใหญ่กว่าปลาย เล็กน้อย หากเป็นลำไส้ก็อีกแบบ นั้น อาจจะไปคุดไปออกมา ในกรณีที่เป็นมาก หากเป็นไม่มากนักจะเป็นเช่นในรูป สาเหตุที่มักพบบ่อยๆคือ 1.กินอาหารมากเกินไป ปลาจะมีอาการไส้ไหล เมื่องดอาหารปลาจะหายได้เอง ในกรณีไม่มาก จะหายภายใน 3-4 วัน หากไหลออกมากและมีอาการอักเสบร่วมด้วย จะพบว่าบวมแดงและขยายใหญ่หากปล่อยไว้นานไม่มีเลือดมาเลี้ยงอาจเกิดอาการเน่าและอาจเสียชีวิตได้